

Calendário de vacinação 2025

Verifique seu cartão de vacinação e vá ao posto de saúde mais próximo!

CRIANÇAS		
IDADE	VACINA	DOSE
Ao nascer	BCG-ID Previne as formas graves de tuberculose (miliar e meníngea)	Dose única
	Hepatite B (até 30 dias após nascimento)	Dose única
2 meses	Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo Oral contra Rotavirus Humano (VORH) Previne diarreia por rotavirus	1ª Dose
3 meses	Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	1ª Dose
4 meses	Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo Oral contra Rotavirus Humano (VORH) Previne diarreia por rotavirus	2ª Dose
5 meses	Meningocócica C Previne meningite e meningococemia (infecção generalizada)	2ª Dose
6 meses	Pentavalente (DTB + Hib + Hepatite B) Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite e infecções por Hib Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil	3ª Dose
	COVID-19 Previne contra formas graves e óbitos	1ª Dose*
6 meses a 5 anos	Influenza Previne o vírus que causa a gripe	Dose única (para crianças que já receberam o imunizante em campanhas anteriores) 1ª Dose (para crianças recebendo o imunizante pela primeira vez) 2ª Dose (30 dias após a primeira dose)

CRIANÇAS		
IDADE	VACINA	DOSE
7 meses	COVID-19 Previne contra formas graves e óbitos	2ª Dose*
9 meses	Febre amarela (atenuada)	1ª Dose
	COVID-19 Previne contra formas graves e óbitos	3ª Dose*
12 meses	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	1ª Dose
	Meningocócica ACWY Previne meningite e meningococcemia (infecção generalizada) Pneumocócica 10-valente (conjugada) Previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo	Reforço
15 meses	Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche	1º Reforço
	Poliomielite Inativada (VIP) Previne a paralisia infantil	Reforço
	Hepatite A Tríplice Viral (SCR) + Varicela Previne sarampo, caxumba e rubéola e varicela	Dose única
4 anos	Tríplice Bacteriana (DTP) Previne difteria, tétano e coqueluche	2º Reforço
	Varicela	2ª Dose
	Febre amarela (atenuada)	Reforço

CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
IDADE	VACINA	DOSE
9 a 14 anos	Papilomavírus Humano (HPV) Previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais. Pode ser aplicada até 14 anos 11 meses e 29 dias.	Dose única
11 a 14 anos	Meningocócica ACWY Previne a doença meningocócica causada pela bactéria dos sorogrupos A, C, W, Y.	Dose única
11 a 19 anos	Hepatite B (recombinante)	Três doses
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	Uma dose a cada 10 anos
	Febre amarela (atenuada)	Dose única
	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Duas doses

ADULTOS E IDOSOS		
IDADE	VACINA	DOSE
20 a 29 anos	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Duas doses
30 a 59 anos	Tríplice Viral (SCR) Previne sarampo, caxumba e rubéola	Dose única
20 a 59 anos	Hepatite B (recombinante)	Três doses
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	Uma dose a cada 10 anos
	Febre amarela (atenuada)	Dose única
60 anos e mais	Hepatite B (recombinante)	Três doses
	Influenza (inativada) Previne o vírus que causa a gripe	Dose anual
	Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	Uma dose a cada 10 anos
	COVID-19 Previne contra formas graves e óbitos	Uma dose a cada 6 meses

GESTANTES	
VACINA	DOSE
Hepatite B (recombinante)	Três doses
Dupla Bacteriana adulto (dT) Previne difteria e tétano	Duas doses
Tríplice Bacteriana Acelular (dTpa) Previne difteria, tétano e coqueluche acelular	Uma dose a cada gestação (a partir da 20ª semana gestacional)
Influenza (fracionada, inativada) Previne o vírus que causa a gripe	Dose anual
COVID-19 Previne contra formas graves e óbitos	Anual ou a cada gestação

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para cada vacina, deve-se avaliar a caderneta/cartão de vacinação apresentada no momento (data da última dose de vacina registrada e número de doses recebida anteriormente) e a idade do indivíduo, identificando a necessidade de iniciar/completar o esquema de vacinação ou realizar os reforços. Portanto, não é preciso reiniciar o esquema de vacinação caso o adulto, por exemplo, apresente no ato da vacinação o registro de doses recebidas em qualquer idade e ciclo de vida (infância e adolescência).

RECOMENDADAS TEMPORARIAMENTE

IDADE	VACINA	DOSE
10 a 14 anos	Dengue Previne contra os quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4).	Duas doses, com intervalo de três meses entre cada uma
15 a 19 anos (temporariamente)	Papilomavírus Humano (HPV) Previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais. Pode ser aplicada até 14 anos 11 meses e 29 dias.	Dose única

COVID-19

ROTINA	PERIÓDICA
2 DOSES OBRIGATÓRIAS, PARA CRIANÇAS DE 6 E 7 MESES ATÉ 4 ANOS (VACINA MODERNA); 3 DOSES OBRIGATÓRIAS, PARA CRIANÇAS DE 6, 7 E 9 MESES ATÉ 4 ANOS (VACINA PFIZER BABY); 2 DOSES OBRIGATÓRIAS ANUAIS (A CADA 6 MESES) PARA IDOSOS; 1 DOSE OBRIGATÓRIA ANUAL PARA GESTANTES.	IMUNOCOMPROMETIDOS E OUTROS GRUPOS PRIORITÁRIOS, QUE RECEBEM DOSES UMA OU DUAS VEZES AO ANO.

ENTENDA CASO A CASO

CRIANÇAS ENTRE 6 MESES E 4 ANOS:


QUE RECEBERAM DUAS DOSES OU MAIS



01 dose da vacina com intervalo de 4 meses após a última dose recebida.


QUE NUNCA SE VACINARAM

VACINA MODERNA




02 doses com intervalo de 4 semanas entre D1 e D2.

VACINA PFIZER BABY



03 doses da vacina com intervalo de 4 semanas entre D1 e D2 e 8 semanas entre D2 e D3.

QUE SÃO IMUNOCOMPROMETIDAS E NUNCA VACINADAS



03 doses da vacina com intervalo de 4 semanas entre D1 e D2 e 8 semanas entre D2 e D3.

QUE POSSUEM O ESQUEMA INCOMPLETO

Completar esquema com a vacina disponível.

IMUNOCOMPROMETIDOS ACIMA DE 5 ANOS:

QUE NUNCA SE VACINARAM



03 doses da vacina com intervalo de 4 semanas entre D1 e D2 e 8 semanas entre D2 e D3.

QUE RECEBERAM UMA DOSE



02 doses da vacina com intervalo de pelo menos 3 meses entre a dose previamente tomada e a primeira e intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda aplicada.

QUE RECEBERAM DUAS DOSES OU MAIS



02 doses da vacina com intervalo de pelo menos 3 meses entre a dose previamente tomada e a primeira e intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda aplicada.

DOSE PERIÓDICA DE GRUPOS PRIORITÁRIOS (ACIMA DE 5 ANOS):

IDOSOS E IMUNOCOMPROMETIDOS



02 doses anuais com intervalo de 6 meses.

GESTANTES, PUÉRPERAS, PESSOAS VIVENDO EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI E RI) E SEUS TRABALHADORES; INDÍGENAS; RIBEIRINHOS; QUILOMBOLAS; TRABALHADORES DA SAÚDE; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE; PESSOAS COM COMORBIDADES; PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (≥ 18 ANOS); FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE; ADOLESCENTES E JOVENS CUMPRINDO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS; PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA;



01 dose de intervalo anual



POPULAÇÃO GERAL (NÃO PRIORITÁRIA) QUE NUNCA SE VACINOU



Receber 01 dose da vacina.